

FLORAISONS OBSERVÉES DANS LES SERRES DU MUSÉUM
PENDANT L'ANNÉE 1937

(AUTRES QUE CELLES SIGNALÉES DANS LES LISTES PRÉCÉDENTES) ¹

PAR A. GUILLAUMIN et E. MANGUIN.

MONOCOTYLÉDONES

- Acampe papillosa* Lindl.
Æchmea mexicana Bak.
Agave Haynaldii Tod.
Alocasia × *van Houtteana* Hort. ex Gentil.
Aloe purpurascens Haw.
— *saponaria* Haw., var. *variegata* Hort.
Angraecum eburneum Thou.
— *gracilipes* Rolfe.
— *Scottianum* Reichb. f.
Anthurium velutinum Linden, var. *glaucum*.
Aponogetum crispum Thunb.
× *Brassocattleya André Maron* Maron (× *BrassoCattleya Mrs J. Leemann*.
× *Cattleya Schræderæ*) = [(*Brassavola Digbyana* × *Cattleya Dowiana*)
× *Cattleya Schræderæ*].
× *BrassoCattleya Idole* Vacherot (*BrassoCattleya M^{me} Charles Maron* ×
Cattleya Empress Frederick).
× *BrassoCattleya Juliet* Lacroze (*BrassoCattleya Mrs J. Leemann* × *Catt-*
leya chocoensis, var. *alba*).
× *BrassoCattleya M^{me} Bokanowski* Marcoz (? × ?).
× *BrassoCattleya M^{me} Charles Maron*, var. *Marthe Gratiot* (*Cattleya Gigas*,
var. *alba* × *Lælia Digbyana*).
BrassoCattleya M^{me} Marie Ruffier Guttin (*BrassoCattleya M^{me} Charles*
Maron × *Cattleya Percivaliana*) soit. [(*Brassavola Digbyana* × *Cattleya*
Warcewiczii) × *Cattleya Percivaliana*].
Calanthe × *Bryan* Cookson, var. *William Murray* Cookson (*vestita*, var.
rubro-oculata × *Regneri*, var. *Williamsii*).
Calathea Pavonii Kœrnicke = *C. tubispatha* Hook.
Carex Morrowii Boott, var. *marginata*.
Cattleya × *Alfred Fowler* Fowler = *C.* × *Jeanne Payet* Marcoz (*granulosa*
× *labiata*, var. *Trianæ*).

1. Voir pour les listes précédentes le *Bulletin du Muséum* à partir de 1920.

Bulletin du Muséum, 2^e s., t. X, n^o 1, 1938.

- Cattleya* × *Diadem* Sander (*H. S. Leon* × *labiata*, var. *Trianae*, sub var. *Emperor*).
— *Fabia* Veitch, var. *alba* (*Dowiana* × *labiata*).
— × *Falco* Fowler (*Dowiana*, var. *aurea* × *Dupreana*). soit [(*Dowiana* var. *aurea*) × (*Warneri* × *Warscewiczii*)].
Cattleya labiata Lindl., var. *Gaskelliana* Veitch, subvar. *alba*.
— × *Magpie* Sander (*Goodsoniae* × *Maggie Raphael*).
— × *Mantini* Mantin (*Bowringiana* × *Dowiana*).
— × *Mrs Myra Peeters* Peeters (*Gaskelliana*, var. *alba* × *Warneri*, var. *alba*).
Cattleya Skinneri Batem.
— *Sphinx tenebrosa* × *Fabia*.
— × *Suzanne Hye* Hye (*Gaskelliana*, var. *alba* × *Mossiae*, var. *Wagneri*).
— × *Ville d'Annecy* Marcoz (*Dominiana* × *Warneri*).
Cirrhopetalum (*pedatum* ? × *pulchrum* N. E. Br.).
Cœlia bella Reichb. f.
Cœlogyne ochracea Lindl. (*Janin* f. 14, 1937) [GUILLAUM. det.].
Curculigo latifolia Dryand.
Cyanotis somaliensis C. B. Clarke.
Cymbidium × *Architect* J. H. Hughes (*Cerès* × *Doris*).
— × *Cerès* Smith (*I. Ansonii* × *insigne*, var. *Sanderi*).
— × *Doris* Mac Bean (*insigne*, var. *Sanderi* × *Tracyanum*).
— *insigne* Rolfe, var. *Sanderi*.
— × *Lilian Sander* Sander [(*grandiflorum* × *insigne*, var. *Sanderi* × *Lowianum*) × (*insigne* var. *Sanderi*)].
Cymbidium × *Lowgrinum* Measures (*Lowianum* × *tigrinum*).
Cymbidium Lowianum Reichb. f. — Indo-Chine (*Delacour*, 29 mai 1934, *M^{me} Gondron* f. 213, 1933) [GUILLAUM. det.].
Cymbopogon Martinii Stapf.
Cypripedium × *Alma Gevaert* Pauwels (*Lawrenceanum*, var. *Hyeantum* × *Mandix* soit [(*Lawrenceanum*, var. *Hyeantum*) × (*callosum* var. *Sanderæ* × *Lawrenceanum*, var. *Hyeantum*)].
Cypripedium × *Handburyanum* Handbury (*Maudix* × *Leeanum*, var. *Leoustoneuse*).
— × *Helen II* Dallemagne, var. *Westonbert Holford* (*bellatulum* × *insigne*, var. *Harefield Hall*).
Cypripedium Io Cookson, var. *grande* × *Niobé* Veitch, c'est-à-dire [(*Argus* × *Lawrenceanum*) × (*Fairrieianum* × *Spicerianum*)], obtention du *D^r MARÇAIS*.
Cypripedium × *Jaffa* Handbury (*Leeanum*, var. *Leoustoneuse* × *Memoria Jerninghamix*).
Cypripedium Lathamianum, var. *superbum* × *Kimball-Sanderæ*.
— *Lemannii Ducis* Lambeau (*Alcibiades*, var. *Illustrious* × *Curtmannii*).
Cypripedium Maudix × *Acteus*.
— *nitens*, var. *Sallieri* × *Acteus*.
— × *Norab* Holford (*aurea*, var. *Ædippe* × *Monsieur de Curte*).
— × *Porthos* Vacherot et Lecoufle (*Atlantis* × *Perseus*).
Dendrobium Kingianum Bidwill.
Dyckia longipetala Baker = *Deuterocohnia longipetala* Mez.

Dieffenbachia Parlatoresi Linden et André, var. *marmorata* Linden et André.

Epidendrum equitans Lindl.

Eria obesa Lindl.

Eulophia maculata Reichb. f. — Guinée-française (Chouard, f. 247, 1936, n° 9 et n° 6), [GUILLAUM. det.].

Gasteria fasciata Haw. — Afrique du Sud : district de Port Elisabeth (Humbert, f. 327, 1933) [GUILLAUM. det.].

Gasteria fasciata Haw. var. **minima** Hort. mss. = *G. minima* Hort ¹.

× *Gasteraworthia Holtzei* Guillaum. = *Gasteria* × *Holtzei* Haw. (*Gasteria verrucosa*, var. *intermedia* × *Haworthia radula*).

Gasteria lingua Link, var. *minor*.

× *Gastrolea Lapaixii* A. Guillaum. (*Gasteria maculata* × *Aloe aristata*).

Guzmania lingulata Mez, var. *cardinalis* Hort.

Hechtia Schottii Bak. × *glomerata* Zucc.

Lælia Eug. Bouillet Maron (*harpophylla* × *glauca*) [GUILLAUM. det.].

× *Læliocattleya Bella* Veitch (*Lælia purpurata* × *Cattleya labiata*).

LæliaCattleya Britannia Sander, var. *alba* Vacherot et Lecoufle (*Cattleya Warscewiczii* × *Læliocattleya Cunhamiana*) c'est-à-dire [(*Cattleya Warscewiczii*) × (*Cattleya Mossiæ* × *Lælia purpurata*)].

× *Læliocattleya elegans* Rolfe (*Cattleya Leopoldii* × *Lælia purpurata*)

× — *flammea* × *Cattleya Fabia*.

× — *Gottoiana* Douglas (*Cattleya Warneri* × *Lælia tenebrosa*).

× — *Montréal* Sander (*exoniensis* × *luminosa*).

× — *Sunburst* Charlesworth (*Cattleya Dowiana*, var. *aurea* × *Læliocattleya Carmencita* = [(*Cattleya Dowiana*, var. *aurea*) × (*Cattleya Dowiana* × *Lælia tenebrosa*)].

× *Læliocattleya Val de l'Eau* Sander (× *Læliocattleya Cora*, var. *plumosa* × *Cattleya Schroderæ*).

× *Læliocattleya Welsiana* Sander (*Cattleya labiata*, var. *Trianæ* × *Lælia purpurata*).

Lycaste Skimmeri Lindl., var. *alba* Linden.

Masdevallia Veitchiana Reichb. f.

Maxillaria variabilis Batem.

Miltonia × *Saint André* Sander (*Bleuana*, var. *Sanderi* × *Roetzlii*).

— *vexillaria* Benth., var. *gigantea*.

Musa Mannii Wendl.

Mystacidium Leonis Rolfe = *Angræcum Leonis* Nichols.

Octomeria alpina Rodrig.

× *Odontioda Borda* Charlesworth (*Cochlioda Næzliana* × *Odontoglossum* × *Nathaniel*).

× *Odontioda Bradshawiae* Charlesworth (*Cochlioda Næzliana* × *Odontoglossum crispum*).

× *Odontioda Clarissa* M. et H. (× *Odontioda Bradshawiæ* × *Odontoglossum* × *illustrissimum*) soit [(*Cochlioda Næzliana* × *Odontoglossum crispum*) × (*Odontoglossum* × *ardentissimum* × *Lambauianum*)]

1. Plante restant de petite taille (ne dépassant pas 5 cm. de hauteur), feuilles, environ 12, ne dépassant 12 cm. de longueur.

- c'est-à-dire [(*Cochlioda Næzliana* × *Odontoglossum crispum*)] × [(*O. crispum* × *Pescatorei*) × (*crispum* × *Rolfæ*)].
- × *Odontioda Corail* Vacherot Lecoufle (*Odontioda Brakenhurst* × *Odontoglossum Eximillus*) soit [(*Cochlioda Næzliana* × *Odontoglossum Harryanum*) × *Odontoglossum eximium*] × [*Odontoglossum eximium* × *illustrissimum*].
- Odontoglossum Rossii* Lindl., var. *majus* Warn.
- Oncidium Kramerianum* Reichb. f.
- Ornithogalum caudatum* Jacq. ¹
- Odontoglossum* × *Le Braz* Vacherot et Lecoufle (*Aphrodite* × *Thecla*).
- Paphiopedilum amabile* H. Hallier (1895) = *P. callosum* Kerch. var., *angustisepala* Guillaum. ²
- *Argus* Pfitzer — Philippines (provenant de l'Exposition coloniale donné par M. le Gouv. Gén. Olivier, f. 380, 1931 [GUILLAUM. det.].
- Paphiopedilum hirsutissimum* Pfitzer = *Cypripedium hirsutissimum* Lindl.
- Phajus maculatus* Lindl. forme à feuilles vertes — Annam : près Djiring, 1100-1200 m., (*Poilane* n° 24664, f. 231, 1935,) [GAGNEPAIN det.] Nouveau pour l'Indo-Chine.
- Phalænopsis** × **Jardin des Plantes** Guillaum. hybr. nov. (*Wiganix* × *Ariadne*) = [(*Schilleriana* × *Stuartiana*) × (*Aphrodite* × *Stuartiana*)].
- Pitcairnia corallina* Linden et André.
- Pleurothallis tribuloides* Lindl.
- Prescottia stachyoides* Lindl. — Guadeloupe (*Lami*, f. 102, 1936).
- Saccolabium violaceum* Lindl.
- Sagittaria subulata* Buch., var. *pusilla* Buch.
- Scilla lanceæfolia* Bak.
- Scuticaria Steelii* Lindl.
- × *Sophrocattleya Dora* Dadvison (*Cattleya Dowiana* × *Sophrocattleya Cleopatra*), c'est-à-dire [(*Cattleya Dowiana*) × (*Cattleya Leopoldii* × *Sophronitis grandiflora*)].
- Tillandsia Balbisiana* Schult. f.
- *Bradeana* Mez et Tonduz — Costa-Rica (*Biolley*, donné par Roland-Gosselin, f. 260, 1925).
- Tillandsia Ortgiesiana* Bak. ? — Coll. Roland-Gosselin, f. 265, 1925, envoyé à ROLAND-GOSSELIN par MEZ (n° 13) qui pensait que c'est une espèce très voisine de *T. Ortgiesiana* mais distincte.
- Vanda* × *Burgeffii* Jard. bot. de Munich (*Sanderiana* × *suavis*).
- *lamellata* Lindl.
- Warscewiczella discolor* Reichb. f. = *Zygopetalum discolor* Reichb. f.
- Zamioculcas Loddigesii* Schott.

1. C'est la plante trouvée au Maroc en 1912 par MOURET, que JAHANDIEZ avait donnée au Muséum (f. 215, 1928) sous le nom d'*Urginea Mouretii* Batt. et Trab. et que j'avais identifiée à un *Ornithogalum*, identification confirmée par JAHANDIEZ et MAIRE (*Catal. Pl. Maroc*, I, p. 127, 1931, comme *O. caudatum* Jacq., de l'Afrique du Sud. — A. G.

2. L'espèce réintroduite au Muséum par DELACOUR en 1924, y a fleuri pour la première fois en janvier 1925 et depuis chaque année. Le *P. amabile* a été cité par DESBOIS (*Cyprip.*, p. 45, 1898) et décrite par PFITZER (*Pflanzenreich*, IV, 50, *Orchid. Pleonand.*, p. 80 (1903).

DICOTYLÉDONES

- Acacia arabica* Willd.
— *pentadenia* Lindl.
— *rupicola* F. Muell.
Achimenes hirsuta DC.
Æglopsis Chevalieri Swingle.
Æonium canariense Webb et Berth.
— *gorgoneum* J. A. Schmidt.
Astrophytum capricorne Britt. et Rose.
Begonia conchiæfolia A. Dietr.
— *Haageana* Hort. ex W. Watson.
Bryophyllum uniflorum Berger.
Callistemon salignus Sweet.
Clerodendron Thomsonæ Balf., var. *variegatum* Hort.
Columnnea Oerstediana Klotsch, forme à feuilles et calice bronzés.
Crassula conjuncta N. E. Br.
— *falcata* Wendl.
— *obvallata* L.
— *tecta* L. f.
— *yunnanensis* Franch.
Delosperma algoensis L. Bolus.
Dicyrta Warcewicziana Regel.
Diospyros dodecandra Lour.¹
Drosera capensis L.
Echeveria amœna L. De Smet.
— *nodulosa* Otto.
E. — *retusa* Lindl.
Euphorbia Leviana Croizat = *E. ceseiformis* Boiss., non L.
— *neglecta* N. E. Br.
— *obesa* Hook. f.
Faucaria Boscheana Schwant.
— *felina* Schwant.
Ficus aggregata Vahl.
— *pandurata* Hance.
— *quercifolia* Roxb.
Ficus trachyphylla Fenz.
— *triangularis* Warb.
Glottiphyllum cultratum N. E. Br. = *Mesembryanthemum longum*, var. *declive* Salm. (Jard. bot. de Gand f. 127, 1935) [GUILLAUM det.].
Goethea Makoyana Hook. f.
Hymenocyclus luteolus Schwant.
Ionidium polygalæfolium Vent.
Ipomaea Horsfalliæ Hook.
Jacaranda ovalifolia R. Br.

1. Cette espèce signalée par LOUREIRO comme spontanée et cultivée en Annam (ce qu'il appelait Cochinchine) ne figure pas dans la *Flore de l'Indochine* III et le nom vulgaire *Cay thi tram* n'y est pas mentionné. — A. G.

- Kalanchoe aromatica* Perr. de la Bât.
— *Cassiopei* Damman.
— *Ena* Hort.
— *eriphylla* Hilsenb. et Bojer.
— *glaucescens* Britten.
— *laxiflora* Bak. = *K. crenata* Hamet, non Haw. — Madagascar (*François*, f. 326, 1935) [GUILLAUM det.].¹
Kalanchoe thyrsiflora Haw. — Afrique du sud, Port Elizabeth, provenant de Queenstown (*Humbert*, f. 115, 1934).
Limnobium stoloniferum Griseb. = *L. bogotense* Kunth.
Limnophila Griffithii Hook.
Lippia turbinata Griseb.
Lobivia andalgalensis Britt et Rose.
— *famatinensis* Werd.
Mamillaria coronaria Haw.
Manihot carthaginensis Müll.-Arg.
Muehlenbeckia platyclados Meissn.
Neomamillaria elongata Britt. et Rose.
Pachypodium bispinosum A. DC.
Pelargonium tomentosum Jacq.
Phyllobolus resurgens Schwant.
Pilea serphyllifolia Wedd.
Rebutia senilis Beckbg.
Rhipsalis dissimilis K. Schum.
Rhynchosia phaseoloides DC.
Ruellia Blumci Steud.
Sedum potosinum Rose.
Selenicereus pteranthus Britt. et Rose.
Senecio junceus Haw. ;
Stapelia hirsuta L. ;
Stapelia hirsuta var. *inguipectala* N. E. Br.
Stapelia variegata L., var. *bufonia* N. E. Br.
Streptocarpus Haygartii N. E. Br. ex C. B. Clarke
Tabebuia pallida Miers
Triolena scorpioides Naud.

1. A noter — ce que j'avais déjà remarqué sur d'autres espèces fleurissant en serre — que les corolles restent beaucoup plus courtes (ici à peine plus longues que le calice) et d'une teinte verdâtre (ici vert jaunâtre au lieu de jaune pâle) alors que les étamines conservent leur longueur relative et que la fleur ayant, dans son ensemble, un aspect normal, on pouvait croire avoir affaire à une autre espèce. — A. G.